

# EC FERTİLİZER BORON ETANOL AMİN PROTİENT BORONE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W  
Suda Çözünür Bor (B) : % 11



## KULLANIM ALANI, SEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI:

**SERT ÇEKİRDEKLİLER (ŞEFTALİ, KİRAZ, KAYISI, ERİK VS.):** Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe göz döneminde, ayrıca hasat sonrasında yapraklar dökülmeden önce yapraktan 100 litre suya 75-150 cc dozunda uygulanır.

**YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER (ELMA, ARMUT, AYVA VS.):** Gözler patladığında ve taç yapraklar dökülünce ve hasat sonrası yapraklar dökülmeden önce yapraktan 100 litre suya 75-150 cc dozunda uygulanır. Çiçeklenme döneminde kullanılmaz.

**LAHANA, BRÜKSEL LAHANASI, KARNABAHAR, BROKOLİ:** Bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde kullanılır. Gerekirse 10-14 gün arayla damlama sulama ile 200 cc/ da dozunda tekrarlanır.

**HAVUÇ:** Bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır. Gerekirse 10-14 gün arayla tekrarlanır. Düşük doz hafif bünyeli topraklarda, yüksek doz ağır bünyeli topraklarda damlama sulama ile 150-200 cc/ da dozunda uygulanır.

**ŞEKERPANCARI, ŞALGAM:** Bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde kullanılır. Gerekirse 10-14 gün arayla damlama sulama ile 200 cc/ da dozunda tekrarlanır.

**BEZELYE, FASULYE, SOYA VE BAKLAGİLLER:** Bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır. Gerekirse 10-14 gün arayla damlama sulama ile 150 cc/ da dozunda tekrarlanır.

**KANOLA:** Gövde genişlemeye başlarken yapraktan 200 cc / 100 Lt Su dozunda uygulanır.

**ÇİLEK:** Beyaz göz döneminde yapraktan 100 litre suya 75 cc dozunda uygulanır.

**AYÇİÇEĞİ:** İki çift yapraklı dönemi ile çiçek gözü dönemi arasında kalan devrede uygulanır. Gerekirse bu devre içinde 10-14 gün ara ile tekrarlanabilir. Gerekirse 10-14 gün arayla damlama sulama ile 150-200 cc/ da dozunda tekrarlanır.

**BAĞ:** Yapraklar çıktıktan sonra çiçek demetleri belirginde ve dane tutumunda olmak üzere 2 kez yapraktan 100 litre suya 75 cc dozunda uygulanır.

**MISIR:** Bitkilerin 3-6 yapraklı döneminde uygulanır. Gerekirse 10-14 gün sonra aynı dozda yapraktan 100 litre suya 150 cc dozunda uygulanır.

**DOMATES:** Bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde uygulanır. Gerekirse 10 gün ara ile tekrarlanır. Düşük doz yapraktan 100 litre suya 50 cc damlama sulama ile 75-150 cc/ da verilir.

**PATATES:** İlk uygulamaya %100 çıkıştan 1 hafta sonra, 2.uygulama 10-14 gün sonra, 3.uygulama ise yumru teşekkülü esnasında damlama sulama ile 100 cc/da dozunda uygulanır.

**SOĞAN:** Püskürtmeye elverişli yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda kullanılır yapraktan 100 litre suya 75 cc dozunda uygulanır. Gerekirse 10-14 gün sonra tekrarlanır.

**NARENCİYE:** Beyaz göz döneminde veya beyaz gözler ayrıldığında damlama sulama ile 150-200 cc/ da yapraktan 100 litre suya 150-200 cc dozunda uygulanır.

**ZEYTİN:** Çiçeklenme öncesinde uygulanan ilk ilaçlamada önerilen dozda ilaca karıştırılarak, yapraktan 100 litre suya 100-150 cc dozunda çiçeklenme sonrası ikinci uygulama aynı dozda yapılır. Damlama sulama ile 150-200 cc/ da dozunda uygulanır.

**MARUL:** Kıvrık salata çıkıştan veya şaşırtmadan 10-15 gün sonra damlama sulama ile 75 cc/ da dozunda uygulanır.

**SERALARDA:** Çıkıştan veya şaşırtmadan 10-15 gün sonra yapraktan 100 litre suya 150 cc dozunda uygulanır

**MUZ:** Çiçeklenmeden hasada kadar 3 haftalık aralıklarla damlama sulama ile 150-200 cc/ da dozunda uygulanır

**TÜTÜN:** Tarla dönemi başlangıcından itibaren 15 gün arayla 2 kere damlama sulama ile 100 cc/ da dozunda uygulanır

**FINDIK:** Mart ve haziran ayları arasında yapraktan 100 litre suya 75 cc dozunda uygulanır.

### **FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

### **CÖZÜNÜRLÜĞÜ ve KARISABİLİRLİĞİ:**

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Ön deneme yapılarak karıştırılması tavsiye edilir.

### **DEPOLAMA ŞARTLARI**

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

### **UYARILAR:**

- \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- \*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- \*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- \*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO	: 1035
TESCİL NO	: 25993
PARTİ/SERİ NO	:
ÜRETİM TARİHİ	:
SON KULLANMA TARİHİ	: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
NET AĞIRLIK	: 0.250-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-35.72 Litre 0.350-0.7-1.4-2.8-4.2-7-14-21-28-35-50 Kg

### **ÜRETİCİ FİRMA**

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA GIDA  
TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA SAN ve TİC LTD ŞTİ  
Atatürk Mahallesi 217. Sokak No: 15 TURGUTLU MANİSA  
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22



### **TAAHHÜT**

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA  
GIDA TURİZM İNŞ. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Atatürk Mah. 217. Sok. No: 15 TURGUTLU / MANİSA  
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22  
TURGUTLU V D 396 047 1749

Faruk DENİZ  
Şirket Vekili